




복약안내문을 작성하고 출력할 수 있습니다.

복약안내문 출력

환자번호	0000002195	환자이름	이진	생년월일	1969-10-14
처방일	2023-06-05	진료과	IM	병원명	경기도립노인전문

프린트하기

약품명	복약안내	
리포메트 정 20mg 	<p>[효능] 체내 콜레스테롤 합성을 감소시켜, 혈중 콜레스테롤과 중성지방의 수치를 낮춥니다.</p> <p>[용법] 1일 1회 1 정씩 / 21일 / 저녁 식후</p> <p>1. 매일 같은 시간에 복용하는 것이 좋으며, 이 약 복용 중에 자몽 및 자몽주스의 섭취와 음주는 삼갑니다.</p> <p>2. 운동 및 식이요법과 병행하는 것이 중요합니다.</p> <p>3. 정기적인 검사를 진행할 경우 최적의 치료 효과를 위해 모든 검사 일정을 잘 지키도록 합니다.</p> <p>4. 근육질환 증상(근육통, 근 쇠약감 등), 간질환 증상(황달, 짙은색 소변 등), 피부 발진/벗겨짐, 알레르기반응 등이 나타나면 즉시 의사, 약사에게 알립니다.</p>	삭제
글라비스 정 1000mg 	<p>[효능] 혈당조절을 도움으로써 제 2형 당뇨병의 치료를 위해 사용됩니다.</p> <p>[용법] 1일 2회 1 정씩 / 21일 / 아침,저녁 식후</p> <p>1. 이 약은 의사, 약사의 지시에 따라 식사와 함께 복용합니다. 약간의 금속성 맛이 있을 수 있습니다.</p> <p>2. 불규칙한 식사, 심한 운동, 음주는 저혈당 및 젖산산증 발생 위험을 높이므로 삼갑니다.</p> <p>3. 당(설탕, 꿀 등) 함유 음식을 항상 휴대하여 저혈당 증상이 나타날 경우 바로 섭취할 수 있도록 합니다.</p> <p>4. 알레르기 반응, 젖산산증 증상(비정상적인 피로감, 근육통, 호흡곤란 등) 등이 나타나거나 저혈당 증상(허기, 흐린 시야, 심장박동 증가, 어지러움 등)이 지속되는 경우 즉시 의사, 약사에게 알립니다.</p>	삭제
프리살탄 정 10mg 	<p>[효능] 고혈압의 치료에 사용합니다.</p> <p>[용법] 1일 1회 1 정씩 / 21일 / 아침 식후</p> <p>1. 매일 같은 시간에 복용하며, 증상이 나아지더라도 의사의 지시없이 갑자기 복용을 중단하지 않습니다.</p> <p>2. 이 약은 태아에게 해로울 수 있으므로 효과적인 피임법을 사용합니다.</p> <p>3. 이 약은 어지러움을 일으킬 수 있으므로, 운전 등 위험한 기계조작을 피하고 일어설 때 천천히 일어납니다.</p> <p>4. 알레르기반응, 소변량/빈도의 변화, 심한 어지러움, 지속되는 심한 설사 등이 나타나는 경우 즉시 의사에게 알립니다.</p>	삭제

프린트하기